

Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale



VALUTAZIONE COMPARATIVA SULL'INCIDENZA DELLA RECIDIVA DOPO L'UTILIZZO DI LEMBI A RIPOSIZIONAMENTO CORONALE E INNESTI DI CONNETTIVO NELLA PATOLOGIA RECESSIVA.

Briguglio F., Sidoti Pinto G.A.*, Briguglio E., Lapi M., Milone N., Isola G.

Dipartimento di Odontostomatologia, Università degli Studi di Messina, Insegnamento di Parodontologia Prof. R. Briguglio. jimmy1985@hotmail.it.

Obiettivo: Nell'ambito della patologia recessiva sono molte le procedure chirurgiche che consentono la copertura delle esposizioni radicolari al fine di risolvere non solo i problemi estetici ma anche l'ipersensibilità dentinale e le eventuali carie radicolari.

Materiali e Metodi: L'obiettivo di questo studio è quello di confrontare, mediante valutazione clinico comparativa a 24 mesi, la tecnica bilaminare e la tecnica del lembo a riposizionamento coronalmente.

Risultati: I risultati indicano come i due approcci chirurgici siano entrambi efficaci per la ricopertura delle recessioni gengivali. Tuttavia si ha una minore incidenza di recidiva allorché viene usata la tecnica bilaminare rispetto al lembo riposizionato coronalmente.

Discussione e Conclusioni: La minor incidenza di recidive nei casi trattati con innesti bilaminari sembra essere dovuta all'aumento quantitativo e qualitativo di tessuto che si ottiene. Questa tecnica offre dunque una così una maggior predicibilità a lungo termine.